

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо застосування «Бланідас софт дез»
з метою гігієнічної дезінфекції шкіри


Організація – розробник: ДЗ «Центральна санепідстанція МОЗ України» за участю ТОВ «Бланідас» (Україна).

Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції.

Місцевим закладам охорони здоров'я дозволяється тиражування цих методичних вказівок у необхідній кількості екземплярів з дозволу організації-розробника.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний
санітарний лікар України



А.М. Пономаренко

«28» листопада 2012 р.

№ 1628

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
щодо застосування засобу «Бланідас софт дез»
з метою гігієнічної дезінфекції шкіри

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу – засіб дезінфікуючий «Бланідас софт дез».

1.2. Виробник – ТОВ «Бланідас», Україна за ТУ У 20.2-36423868-001: 2012.

1.3. Склад засобу: 5-хлор-2-(2,4-дихлорфеноксі) фенол (триклозан) – 0,5% (діюча речовина).

1.4. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Дезінфікуючий засіб «Бланідас софт дез» - готовий до застосування засіб для гігієнічної дезінфекції шкіри у вигляді безбарвної в'язкої рідини без запаху або із легким запахом ароматизатору. Значення рН концентрату – $6,5 \pm 1,5$. М'яко очищує та дезінфікує шкіру.

1.5. Призначення засобу. Засіб «Бланідас софт дез» призначений:
для гігієнічної дезінфекції рук медичного персоналу в закладах охорони здоров'я і лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, у тому числі дитячих і денних стаціонарах, відділеннях неонатології, палатах, блоках і відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених, маніпуляційних, операційних, перев'язувальних кабінетах, хірургічних, терапевтичних, педіатричних, акушерських, гінекологічних, офтальмологічних, фізіотерапевтичних відділеннях лікувально-профілактичних закладів, пологових будинках, поліклініках, стоматологічних клініках і кабінетах, шпиталях, амбулаторіях, диспансерах, фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, центрах з трансплантації органів, медсанчастинах і медпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, донорських пунктах, відділеннях переливання крові, каретах швидкої медичної допомоги, патолого-анатомічних відділеннях, санаторіях, профілакторіях, реабілітаційних центрах, хоспісах, закладах соціального захисту населення, санпропускниках, закладах судово-медичної експертизи, медичних профільних центрах, клінічних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних та інших профільних діагностичних лабораторіях тощо;
для санітарної обробки шкірних покривів пацієнтів в лікувально-профілактичних установах;

для гігієнічного миття шкіри рук та тіла персоналу на підприємствах харчопереробної промисловості, фармацевтичної промисловості, біотехнологічної промисловості з виробництва нестерильних лікарських засобів в приміщеннях класів чистоти С і D і вітамінних заводах, митних терміналах, комунальних об'єктах (включаючи готелі, лазні, басейни, аквапарки, сауни, солярії, салони краси, манікюрні та педикюрні кабінети, спорткомплекси, торгово-розважальні центри, клуби, культурно-оздоровчі комплекси, офіси), на підприємствах громадського харчування і торгівлі, ринках, магазинах, закладах соціального забезпечення, навчально-виховних та учбових закладах різних видів акредитації, дитячих дошкільних закладах,

військових частинах, хоспісах, закладах зв'язку, та банківських установах, пенітенціарних установах.

1.6. Специфічні біологічні властивості засобу: спектр антимікробної дії.

Засіб «Бланідас софт дез» володіє вираженою протимікробною активністю відносно грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів.

1.7. Токсичність та безпечність засобу. Засіб «Бланідас софт дез» за параметрами гострої токсичності згідно класифікації ГОСТ 12.1.007-76 при нанесенні на шкіру і введенні в шлунок відноситься до 4 класу мало небезпечних речовин. Нанесення засобу на ушкоджену шкіру не ускладнює її загоєння. Місцево-подразнюючі, шкірно-резорбтивні і сенсibiliзуючі властивості в рекомендованих режимах засіб не проявляє.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів. «Бланідас софт дез» - готовий до використання засіб, який використовується нерозведеним. Можливість використання в спеціальних дозуючих диспенсерах згідно нормативних документів МОЗ України.

2.3. Термін та умови зберігання засобу. Засіб «Бланідас софт дез» застосовується для дезінфекції одноразово.

3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ.

3.1. Об'єкти застосування. Засіб дезінфікуючий «Бланідас софт дез» застосовують: для обробки рук хірургічної бригади та медичного персоналу перед використанням антисептику;
для гігієнічного миття рук медичного персоналу;
для гігієнічного миття рук та шкіри персоналу
для миття шкірних покривів пацієнтів під час перебування в лікувально-профілактичних закладах;
для гігієнічного миття шкірних покривів лежачих пацієнтів для профілактики відлежок та усунення неприємного запаху;
для гігієнічної обробки рук персоналу на підприємствах харчопереробної промисловості.

3.2. Методи знезараження:

Хірургічне миття рук (2 фаза) – 3 мл засобу наносять на долоні та розподіляють по поверхні рук, включаючи ліктьові згини. Кисті рук з направленими догори кінчиками пальців та передпліччя, з низько розташованими ліктями, обробляють засобом протягом 1 хв, потім змивають проточною водою та висушують одноразовим рушником.

Гігієнічне обробка рук – на зволожену шкіру рук нанести 3 мл засобу та втирати протягом 30 сек, після чого ретельно змити та висушити одноразовим рушником.

Гігієнічне миття шкірних покривів пацієнтів – на індивідуальну мочалку нанести порцію засобу, піною, яка утворилась обробити шкірні покриви, змити теплою водою за допомогою душі.

Гігієнічне миття лежачих пацієнтів - на індивідуальну мочалку нанести порцію засобу, піною, яка утворилась обробити шкірні покриви та змити теплою водою.

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ.

4.1. Засіб для зовнішнього застосування у відповідності з призначенням.

4.2. Уникати потрапляння засобу в очі.

4.3. Зберігати засіб окремо від ліків, в недоступному для дітей місці.

5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ.

5.1. При випадковому потраплянні засобу в очі, слід промити їх проточною водою протягом 10-15 хв та закапати 30% розчином сульцилу натрію.

5.2. При випадковому потраплянні засобу в шлунок необхідно дати випити потріпілому кілька склянок води з 10-20 таблетками подрібненого активованого вугілля. Блювання не викликати. Звернутись до лікаря.

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ.

6.1. Пакування засобу. Засіб пакують у полімерні флакони місткістю від 0,2 до 5 дм³ або полімерні канистри місткістю 10, 20, 30, 40 дм³.

6.2. Умови транспортування. Засіб «Бланідас софт дез» транспортують всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на цих видах транспорту і гарантують збереження засобу і тари.

6.3. При випадковому розливанні великої кількості засобу засипати його адсорбуючим матеріалом (пісок, земля, стружка).

6.4. Зберігати засіб в сухих складських приміщеннях при температурі від +5°C до + 25°C.

6.5. Гарантійний термін зберігання – 12 місяців з дати виробництва.

Пронумеровано та
прошито 4 аркуші

Директор
ТОВ «Бланідає»
Гнатюк В.М.

